


Obr. 4. Kožní nález ve 4. týdnu od zahájení léčby bimekizumabem**Obr. 5.** Kožní nález ve 4. týdnu od zahájení léčby bimekizumabem

placebem a/nebo aktivním komparátorem kontrolovaných studiích fáze 3.

Účinnost a bezpečnost bimekizumabu byly hodnoceny oproti placebo a ustekinu-

mabu (BE VIVID – PS0009), oproti placebo (BE READY – PS0013) a oproti adalimumabu (BE SURE – PS0008).

Účinnost bimekizumabu byla hodnocena s ohledem na celkový vliv na kožní onemocnění, specifické oblasti těla (pokožku vlasů, nehty, dlaně a chodidla), příznaky hlášené pacienty a vliv na kvalitu života.

Léčba bimekizumabem vedla k významnému zlepšení u všech cílových parametrů účinnosti ve srovnání s placebem, ustekinumabem nebo adalimumabem v 16. týdnu.

Účinnost bimekizumabu byla prokázána bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, trvání onemocnění, tělesnou hmotnost, výchozí závažnost PASI a předchozí biologickou léčbu. Bimekizumab byl účinný u pacientů dříve exponovaných biologickým léčivům, včetně anti-TNF/anti-IL-17 a u pacientů dosud neléčených systémovou léčbou. Účinnost u pacientů s primárním selháním terapie anti-IL-17 nebyla zkoumána.

Závěr

Při rozhodování o vhodné léčbě psoriázy pro naši pacientku jsme zohlednili i její kloubní potíže charakteru psoriatické spondylartrity, kdy měla zavedenou systémovou terapii methotrexátem s nedostatečným efektem na zlepšení kožního exantému i na redukcii bolestí kloubů. Bimekizumab měl velmi rychlý účinek na odhojení kožních potíží, pacientka měla již měsíc od zavedení terapie minimální zbytková ložiska psoriázy. Ke zmírnění bolestí kloubů docházelo až od čtvrtého měsíce terapie, efekt nadále trvá.

Pacientce se díky zavedené terapii významně zlepšila kvalita života, což je potvrzeno i hodnotami v dotazníku DLQI.

LITERATURA

1. Hercogová J, et. al. Klinická dermatovenerologie 1. díl. Praha: Mladá fronta, 2019; 166-167.
2. SmPC Bimzelx. Available from: www.sukl.cz.