

**Obr. 1.** Prejav „late-onset“ atopickej dermatitídy u dospelého pacienta s erytémom v oblasti stehna



**Obr. 2.** Flexurálna forma atopickej dermatitídy



**Obr. 3.** Dyshidrotická forma atopickej dermatitídy



**Obr. 4.** Mokvajúce ložisko atopickej dermatitídy v oblasti predkolenia u doččaťa



vázané chronickým, vo väčšine prípadov intenzívnym pruritom (2).

### Diagnostika

Diagnostika atopickej dermatitídy je založená najmä na klinickom obraze a priebehu ochorenia, po splnení diagnostických kritérií (Tab. 1). V prípade nejednoznačného klinického obrazu je diagnóza potvrdená histopatolo-

gickým vyšetrením. Pre tzv. „extrinsic formu“ je typické zvýšenie celkových IgE s pozitívou špecifických IgE, pozitívita prick testov, vysoká hladina IL 4 a 13, mutácia génu pre filagrín, narušenie kožnej bariéry a prítomnosť ostatných súčastí atopického pochodu. Pri „intrinsic forme“ sú prick testy, celkové aj špecifické IgE negatívne, nevyskytuje sa mutácia génu pre filagrín, ani porucha kožnej bariéry (5).

**Tab. 1.** Diagnostické kritériá atopickej dermatitídy

Hlavné diagnostické kritériá	Vedľajšie diagnostické kritériá
dermatitída (s typickou morfológiou a distribúciou)	Dennie-Morganovo znamenie (suborbitálna kožná riasa)
osobný alebo rodinný výskyt atopie	Hertogovo znamenie
pruritus	periorbitálna melanóza
chronický/chronicko-recidivujúci priebeh	keratosis pilaris
	xeróza/ichtyóza
	pityriasis alba
	biely dermatografizmus
	palmoplantárna hyperlinearita
	a iné

**Tab. 2.** Systémová liečba atopickej dermatitídy a stupeň odporúčania: podľa Európskych odporúčaní z roku 2022 (8), aktualizované podľa SPC jednotlivých liekov a EMA (Európska lieková agentúra)

Ťažká forma atopickej dermatitídy	Dlhodobá aj krátkodobá liečba			Krátkodobá liečba
Stupeň odporúčania	Malé molekuly/vek	Cielená liečba/vek	Konvenčné imunosupresíva/vek	Konvenčné imunosupresíva/vek
<b>silný</b>	abrocitinib ≥ 12 rokov baricitinib ≥ 2 roky upadacitinib ≥ 12 rokov	dupilumab ≥ 6 mesiacov tralokinumab ≥ 12 rokov	—	—
<b>slabý</b>	—	—	metotrexát ≥ 3 roky azatioprin ≥ 2 roky (off label)	cyklosporín A ≥ 16 rokov kortikosteroidy (akútne: 0,5 mg/kg/deň)
<b>neodporúča sa</b>	—	omalizumab ustekinumab (off label)	mykofenolát mofetil (off label)	mykofenolát mofetil (off label)