



STRIE JE TAKÉ JIZVA

Contractubex® gel se používá při léčbě

- hypertrofických, atrofických, keloidních, pohyb omezujících a opticky rušících jizev po operacích, amputacích, popáleninách a úrazech
- trvalých kontraktur jizev (např. Dupuytrenova kontraktura) a traumatických kontraktur šlach

Contractubex® gel

- zabraňuje nadměrné tvorbě jizev
- zmírňuje zarudnutí, svědění a pocit napětí na kůži
- zlepšuje pružnost a měkkost jizev
- hydratuje jizvy



CONTRACTUBEX®

GEL 20 g Pro léčbu čerstvých i starších jizev různého původu a typu



www.contractubex.cz

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU

Název přípravku: Contractubex gel. Složení:

100 g gelu obsahuje: 10 g extraktu z *Allium Cepa* L., bulbus (cibule kuchyňské cibule) (0,16:1), extrakční rozpouštědlo: voda, heparinum natricum 40,0 mg (odp. 5000 IU), allantoinum 1,0 g. **Indikace:** Hypertrofické, keloidní, pohyb omezující a opticky rušící jizvy po operacích, amputacích, popáleninách a úrazech; trvalé kontraktury jizev, jako např. Dupuytrenova kontraktura, a traumatické kontraktury šlach, nebo při retraktaci jizev (atrofické jizvy). Contractubex se používá vždy až po uzavření léze.

Dávkování a způsob podání: V tenké vrstvě několikrát denně se gel nanese na kůži a jizevnatou tkáň a jemně vmasíruje. Do úplné absorpce. U keloidů a starých jizev se gel nechá působit přes noc pod obvazem.

Léčba trvá několik týdnů až měsíců. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivou nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku. **Zvláštní upozornění a opatření pro použití:** Přípravek obsahuje ethylparaben (riziko zpožděné alergické reakce); kyselinu sorbovou (riziko kožní reakce, např. kontaktní dermatitidy); parfém s alergenními vonnými látkami (citronelol, geraniol, benzylalkohol, citral a linalool); alkohol. **Interakce:** Studie nebyly provedeny. **Těhotenství a kojení:** Riziko v době těhotenství a kojení není známo. **Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje:** Neuvádí se. **Nežádoucí účinky:** Pruritus, erytém, teleangiektazie, atrofie jizvy. Přípravek je obecně velmi dobře snášen i při dlouhodobém použití. **Druh obalu a velikost balení:** Zasepená hliníková tuba s vnitřním lakem a s HDPE šroubovacím uzávěrem, krabička.

Balení: 20 g, 50 g a 100 g. **Doba použitelnosti:**

2 roky. Po prvním otevření 6 měsíců. Zvláštní opatření pro uchování: Při teplotě do 25°C. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Merz Pharmaceuticals GmbH, Eckenheimer Landstraße 100, 60318 Frankfurt/Main, Německo. **Registrační číslo:** 46/753/97-C. **Datum registrace/prodloužení registrace:** 10.9.1997/3.7.2014. **Datum poslední revize textu:** 20.10.2023. **Přípravek je volně prodejný. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Seznamte se, prosím, s podrobnými informacemi v platném Souhrnu údajů o přípravku nebo na adrese společnosti DESITIN PHARMA, spol. s r.o., Opletalova 25, 110 00 Praha 1, Czech Republic, www.desitin.cz **Poslední revize textu:** 20.10.2023**