

17 je stále nutné žádat o schválení podle paragrafu 16, jelikož tyto léky dosud nejsou plně schváleny pro terapii hidradenitidy.

Pokud pacienti neodpovídají na léčbu adalimumabem, který je dosud jediným schváleným lékem, blokátory interleukinu 17 se ukazují jako velmi slibné. Studie ukazují, že u pacientů, kteří užívali tyto léky, došlo k významnému zlepšení klinických symptomů. Po 96 týdnech léčby se 44,2 %

pacientů dostalo do fáze absolutního zhojení a dalších 57,6 % vykázalo výrazné zlepšení. Stejný pozitivní trend byl pozorován i v redukcí chronických projevů, které jsou charakteristické pro tuto nemoc. Důležitým výsledkem je také zlepšení kvality života pacientů. U významného počtu pacientů se podařilo dosáhnout výrazného poklesu v závažnosti potíží, což je pro pacienty s tímto onemocněním klíčové.

Mezi běžně dostupné chirurgické metody, které mohou být použity, patří tzv. deroofing. Jedná se o postup, při kterém dochází k otevření postižených lézí. Tento zákrok zahrnuje odstranění postižené tkáně až na podkožní tukovou vrstvu, což přispívá k jejich efektivnímu vyčištění. Výsledek zákroku je obvykle velmi pozitivní. Pacienti vykazují výrazné zlepšení již během několika dní po zákroku a jsou bez funkčních omezení.

LITERATURA

1. Sabat R. Hidradenitis suppurativa. Lancet. 2025;405:420-38.
2. Zouboulis ChC, Bechara FG, Fritz K, et al. S2k-Leitlinie zur Therapie der Hidradenitis suppurativa/Acne inversa. Akt Der-

matol. 2024;50:30-83.

3. Elkin K, et al. Hidradenitis suppurativa: Current understanding, diagnostic and surgical challenges, and developments

in ultrasound application. Skin Res Technol. 2020;26(1):11-19.
4. Hercogová J, et al. Klinická dermatovenerologie. 1. a 2. díl. Praha: Mladá fronta; 2019.

Připravujeme do Dermatologie pro praxi

2025

3

Přehledové články

- Alergeny ve výživě
- Kopřivka jako projev alfa-Gal syndromu
- Současné možnosti terapie chronické spontánní kopřivky

Sdělení z praxe

- Pacient s metastazujícím slizničním melanomem léčený imunoterapií
- Mycoplasma pneumoniae indukovaná TEN
- Atypická vyrážka

Okénko estetické dermatologie

- Sebepoškozování u adolescentů a možná korekce jizev

Pro sestry

- Lokální léčba ran a lézí v genitoanální oblasti u žen s ohledem na účelnost krytí a komfort pacientky



VYJDE
V
ŘÍJNU

